

Onkruidgevoeligheidslijst Quickdown

Onkruiden dienen jong te zijn en actief te groeien en niet afgehard (kiemblad- 4 bladstadium).
Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand, maar kunnen opnieuw uitlopen.

Gevoeligheidslijst onkruiden

Akkerdistel	Cirsium arvense	++
Akkerviooltje	Viola arvensis	+++
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	+++
Boterbloemsoorten	Ranunculus spp	++
Brandnetel kleine	Urtica urens	+++
Canadese fijnstraal	Conyza canadensis	+++
Doornappel	Datura stramonium	+++
Ereprijs-soorten	Veronica spp	+++
Grassoorten		-
Guldenroede	Xanthium strumarium	+++
Heermoes	Equisetum arvense	+
Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	+++
Herik	Sinapis arvensis	+++
Hoenderbeet	Lamium amplexicaule	+++
Kamillesoorten	Matricaria spp.	++
Kattenstaart	Amaranthus viridus	+++
Kleefkruid	Galium aparine	+++
Knopkruidsoorten	Galinsoga spp.	+++
Koolzaad	Brassica napus	+++
Kruiskruid klein	Senecio vulgaris	+++
Melganzevoet	Chenopodium album	+++
Melkdistel	Sonchus oleraceus	++
Paarse dovenetel	Lamium purpureum	+++
Perzikkruid	Polygonum persicaria	+++
Uitstaande melde	Atriplex patula	+++
Valse kamille	Anthemis arvensis	+++
Varkensgras	Polygonum aviculare	+++
Veerdelig tandzaad	Bidens tripartita	+++
Veldkers kleine	Cardamine hirsuta	+++
Vogelmuur	Stellaria media	+++
Wilgenroosje	Epilobium parviflorum	+++
Zuringsoorten	Rumex spp	-
Zwaluw tong	Polygonum convolvulus	+++
Zwarte nachtschade	Solanum nigrum	+++

+++ zeer gevoelig

++= gevoelig

+ matig gevoelig

- niet gevoelig